



โรคพิษสุนัขบ้า



ไม่มีทางรักษา ! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อ
ในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขเท่านั้น
แต่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หมู กระต่าย เป็นต้น

**ผู้ที่เป็็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย
เนื่องจากปัจจุบันไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน**

อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



ระยะที่ 1
มีไข้ เบื่ออาหาร
คันแผล 2-10 วัน



ระยะที่ 2
มีอาการทาง
ประสาท คลุ้มคลั่ง



ระยะที่ 3
ภาวะหัวใจล้มเหลว
หัวใจหยุดเต้น
โคม่าและเสียชีวิต

3 ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้

ขั้นตอนที่ 1
พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ขั้นตอนที่ 2
หลีกเลี่ยงไม่ให้
ถูกสัตว์ทำร้าย



ขั้นตอนที่ 3
หลังโดนกัดรีบไปพบแพทย์ทันที
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก





3 ความเข้าใจผิด โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ถูกกัก ก็ติดได้ !

การติดเชื้อ

ถูกสุนัขกัด เลีย ข่วน หรือน้ำลาย
จากสัตว์ที่ติดเชื้อกระเด็นเข้าบาดแผล
หรือตา จมูก ปาก ก็อาจติดเชื้อได้

อาการ

เริ่มแสดงอาการรับเชื้อ 3 สัปดาห์ - 1 ปี

เริ่มแรก : ไข้ต่ำ เบื่ออาหาร

และคลื่นรุนแรงบริเวณแผลถูกกัด
กระสับกระส่าย หนาวสั่น กลืนลำบาก

ระยะสุดท้าย : แขนขาอ่อนแรง
แน่นหน้าอก หดสติและเสียชีวิต

วิธีปฐมพยาบาล

1 ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
และฟอกสบู่หลาย ๆ ครั้ง
ช่วยลดเชื้อได้ 80%

2 ทายาเบตาดีน
และพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน

3 ฉีดวัคซีนให้ครบ
ตามที่แพทย์นัด

- 1  เกิดเฉพาะฤดูร้อน

2  ติดเชื้อได้ทุกฤดู
- 2  เลี้ยงในบ้านไม่ต้องฉีดวัคซีน

3  อาจมีสัตว์ติดเชื้อเข้าบ้าน
กัดสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่รู้
จึงควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปี
- 3  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100%

4  ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง
วัคซีนก็อาจสร้างภูมิคุ้มกัน
ได้ไม่เต็มที่ จะนั้นยังต้องระวัง

ข้อควรรู้

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสเสียชีวิต 100%

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 032-909669 มือถือ : 081-7634700

www.nongplub.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ obt.nongplub@gmail.com

