

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงออกฤทธิ์บรรเทาอาการคันหรือระคายเคือง แต่ไม่ได้ฆ่ายุงให้ตาย นิยมใช้ในรูปแบบทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มี ดีท (DEET) เป็นสารสำคัญ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงทะเบียน อย.วอส. (✓^{๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓}) บนฉลากของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีน้ำมันตะไคร้หอม (Citronella oil) เป็นสารสำคัญ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งชื่อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ และมี การแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลาก ("เลขที่รับแจ้ง ๙๙๙/๒๕๕๐") ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์ในการไล่ยุงภายในได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

ใช้อย่างไร...ให้ปลอดภัย

1.


อ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้ คำแนะนำ และคำเตือนอย่างเคร่งครัด

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบแบ่งหรือโลชั่น ห้ามนำไปทาแทนแป้งหรือโลชั่นทั่วไป ควรทา เมื่อต้องการใช้ป้องกันยุง และระวังมิให้เด็ก นำไปทาเลน

2.

3.

ควรทาเมื่อจำเป็น อย่าวีโต้ต่อกัน เป็นประจำ



กำจัดลูกน้ำยุง...รู้จักใช้ทรายที่มีฟอส

การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ควรใช้ ในกรณี ที่จำเป็น เช่น กรณีภาชนะบรรจุน้ำใช้นั้นไม่สามารถปิดฝาหรือ เปลี่ยนน้ำได้ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบทราย เคลือบด้วยสารกำจัดแมลงที่มีฟอส (temephos) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ทรายที่มีฟอส

ใช้อย่างไร...ให้ปลอดภัย

อัตราส่วนการใช้ทรายที่มีฟอสแต่ละรูปแบบต่อปริมาณน้ำ

ผลิตภัณฑ์	รูปแบบผลิตภัณฑ์	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้	ต่อปริมาณน้ำ
ทรายที่มีฟอส 1%	แกรนูล	1 กรัม หรือ 1 ช้อนตวง*	10 ลิตร
ทรายที่มีฟอส 2%	แกรนูล	0.5 กรัม หรือ 1/2 ช้อนตวง*	10 ลิตร
ทรายที่มีฟอส 10%	เม็ด	1 กรัม หรือ 1 เม็ด**	20 ลิตร
	เม็ด	1 กรัม หรือ 1 เม็ด**	100 ลิตร

*หากมีช้อนตวงแนบมากับผลิตภัณฑ์ และ 1 ช้อนตวง เท่ากับ 1 กรัม
**กรณีฉลากระบุ 1 เม็ดเท่ากับ 1 กรัม



บนฉลากของผลิตภัณฑ์

4.

อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณแก้มตา ริมฝีปาก เปลือกตา รักแร้ หรือบริเวณแผล

5.

ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ หากต้องการหยิบจับ อาหาร ควรล้างมือให้สะอาดเสียก่อน

6.

เก็บผลิตภัณฑ์ให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยน้ำมันตะไคร้หอม ควร ปิดฝาให้สนิท อย่าวีโต้ถูกแสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน

ผลิตภัณฑ์ทรายที่มีฟอสที่มีประสิทธิภาพควรออกฤทธิ์ ควบคุมลูกน้ำยุงได้ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา ในการออกฤทธิ์ควบคุมลูกน้ำยุงของผลิตภัณฑ์ที่ทรายที่มีฟอส อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความถี่ของการใช้น้ำ ตลอดจน ปริมาณน้ำที่ใช้ ไปและปริมาณน้ำที่เติมใหม่ในแต่ละครั้ง การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทรายที่มีฟอส ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงทะเบียน อย.วอส. (✓^{๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓}) บนฉลากของ ผลิตภัณฑ์ และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่ผลิต

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ ใน บ้านเรือนที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ที่ <http://www.appi.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp>

กำจัดน้ำยุง ยับยั้งยุงลาย ป้องกันโรคร้าย ปลอดภัยถ้วนทั่ว



ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง

รู้จักใช้... ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง



ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
โทร. 032 - 909669 (เวลาราชการ)

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงลายไปกัดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนอื่น อีกคนหนึ่ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นได้ทุกคน เป็นแล้วกลับมาก เป็นซ้ำอีกได้ และในกรณีที่เป็นซ้ำจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง

โรคไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วย

1. ระวังอย่าให้ยุงกัดในตอนกลางวัน
2. กำจัดลูกน้ำยุง และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้
 - ปิดปากภาชนะเก็บน้ำให้มีติดชิด ด้วยฝาอลูมิเนียม หรือตาข่าย
 - หมั่นตรวจจุดแจกันดอกไม้และเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
 - เปลี่ยนปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ในภาชนะเก็บน้ำ ที่ปิดฝาไม่ได้
 - เก็บภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว หรือคว่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขัง
 - ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก ผสมลงในน้ำจากรองตู้กับข้าวทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่

กำจัดยุงร้าย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ รวมด้วยช่วยกัน ป้องกันไม่ให้เลือดออก

ป้องกันยุง...รู้จักใช้ผลิตภัณฑ์กำจัด/ไลยุง

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง

ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของ อย. โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครสามารถฉีดพ่นได้เอง จะอยู่ในรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นอัดก๊าซ (aerosol) สารออกฤทธิ์ที่ใช้ ส่วนมากเป็นสารเคมีในกลุ่มไพเรทรอยด์ (pyrethroids)



ปิดปากภาชนะ เก็บน้ำให้มีติดชิด ด้วยฝาอลูมิเนียม หรือตาข่าย



หมั่นตรวจดู แจกันดอกไม้ และ เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์



ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ในภาชนะเก็บน้ำ ที่ปิดฝาไม่ได้



ใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก ผสมลงใน น้ำจากรองตู้กับข้าวทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่

เก็บภาชนะที่มีน้ำขังหรือ ไม้ใช้แล้ว หรือคว่ำภาชนะ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่




1.

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำหน่ายเป็น ไม้ใช้พำเพื่อ

ใช้อย่างไร...ให้ได้ผล

2.

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ คุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงทะเบียน อย.วอส. () บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก หรือใบแทรกที่ให้มาก่อนใช้

3.

ห้ามนำวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเกษตรมาใช้กำจัด แมลงในบ้านเรือน เพราะอาจไม่ ได้ผลและทำให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงได้

4.

อย่าฉีดพ่นในที่ที่มีอาหาร น้ำ เครื่องดื่มวางอยู่ เพราะจะทำให้ ปนเปื้อนได้ และไม่ควรถูกฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย

5.

กรณีฉีดแมลงบิน เช่น ยุง ก่อผลให้ผู้คนและ สัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อนแล้วปิดประตู หน้าต่างให้เรียบร้อย ในการฉีดพ่นให้ใช้ผ้า ปิดปากปิดจมูก เขย่งการป้องกันแล้วฉีดขึ้น ข้างบนห้องทั้ง 4 ด้าน ปิดประตูประมาณ 15-20 นาที จึงเปิดระบายอากาศ กรณีฉีด นอกห้องหรือที่โล่ง ให้ฉีดขณะที่ลมสงบ

6.

ล้างมือหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ฉีดพ่นทุกครั้ง

7.

เก็บผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้พ้นมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟและความร้อน ถ้าใช้หมดแล้ว ห้ามทิ้งลงแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และห้ามเผาทำลาย ควรแยกทิ้งในที่ทิ้งขยะให้ เรียบร้อย