



คำแนะนำสำหรับประชาชนมีข้อแนะนำดังนี้

1. เจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครึ่งแรกเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุ 2-4

เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปี

2. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง

3. ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ

4. ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยคำแนะนำ 5 ย. คือ

- อย่าเหยยให้สุนัขโมโห โกรธ

- อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้นัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ

- อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

- อย่าหยิบ ขามข้าว หรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ
- อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มี เจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ



โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
เกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส เป็นได้
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



แต่ !!
สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ

 สุนัข  แมว

กลุ่มเสี่ยง
คนที่ถูกหมากัด ข่วน
เลียบาดแผล แล้ว**ไม่ไป**
ฉีดวัคซีน



การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด ข่วน เลียบาดแผล



ดูอย่างไร ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก

นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด
เก็บตัว หวาดระแวง

ระยะเตือน

กระวนกระวาย กัดไม่เลือก
เท่าหอน

ระยะอัมพาต

น้ำลายไหล คางห้อยตก
ล้มลง ตาย

ความรู้ที่มักเข้าใจผิด

 

 สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า

 สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น

 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



 โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว
รักษาให้หายได้

 โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว
“รักษาไม่หาย ตายทุกราย”